

## اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر آلودگی نترات در

### آبهای زیرزمینی گستره گرگان، شمال خاور ایران

نوشته: دکتر مجید شاه پسند زاده\*، مصطفی رقیمی\*، سید محمد خادمی\*\*

## The Environmental Impact of Urban Development on Nitrate Contamination of Groundwater Resources in Gorgan District, NE Iran

By: Dr. M.Shahpasandzadeh\* , M.Raghimi\* & M.Khademi\*\*

#### چکیده

بیش از ۸۰ درصد آب شرب شهر رو به رشد و پرجمعیت گرگان، از منابع آبهای زیرزمینی (آبخوانهای زیارت، شصت کلا و گرمابدشت) تأمین می‌شود. تجزیه شیمیایی آبهای زیرزمینی گستره گرگان، وجود دو منطقه با غلظت غیر مجاز نترات (آبخوان زیارت) را در محدوده شهری نشان می‌دهد. الگوی تغییرات غلظت کلر در چاههای با تمرکز بالاتر از حد نترات، از الگوی تغییرات غلظت نترات آب این چاهها تبعیت می‌کند. با وجود قرارگیری آبخوانهای شصت کلا و گرمابدشت در محدوده زمینهای کشاورزی، میزان نترات این آبخوانها نسبت به آبخوان زیارت پایین تر است و عدم تأثیر یا اثر ناچیز کودهای شیمیایی بر آلودگی آبهای شرب این منطقه را نشان می‌دهد. تعیین مقادیر  $NO_3/Cl$  و  $K/Cl$ ، منشأ غلظت غیر مجاز نترات آبهای زیرزمینی این منطقه را فاضلابهای خانگی نشان می‌دهد. همچنین، قطع درختان جنگلی و توسعه شهر گرگان نیز سبب به هم خوردن چرخه نیتروژن و ورود مقادیر قابل توجهی نترات به آبهای زیرزمینی منطقه شده است.

**کلید واژه‌ها:** آبهای زیرزمینی، آلودگی نترات، فاضلاب خانگی، اثرات زیست محیطی، زمین شناسی شهری، گرگان.

#### Abstract

More than 80% of drinking water of highly populated and expanding city of Gorgan, as one of agricultural centers of Iran, is supplied by local groundwater resources (Ziarat, Garmabdasht, and Shast-kola aquifers). Chemical analysis of groundwater samples of Gorgan district indicates two regions of anomalously high concentration of nitrate (Ziarat aquifer) in the urban area. High chloride concentration in water from dug wells corresponds with the anomalous high values of nitrate. Low concentration of nitrate in Shast-kola as well as Garmabdasht aquifers, where main land use is agricultural activities respect to Ziarat aquifer, demonstrates low/no effects of fertilizers on the contamination of groundwater. Determination of  $NO_3/Cl$  and  $K/Cl$  ratios depicts sewage effluents and urban runoff as the main sources of nitrate contamination of the groundwater. Moreover, rapid urbanization and the encroachment of residential development into surrounding forests release considerable nitrate to the underlying shallow aquifers.

**Key words:** Groundwaters, nitrate contamination, municipal sewage slugs, environmental impacts, urban geology, Gorgan.

#### مقدمه

فعالیت‌های کشاورزی، افزایش غلظت نترات در آبها به مقداری بالاتر از حد استاندارد است. نترات به علت وجود اکسیژن حل شده یکی از آنیونهای پایدار آب بوده (Hamilton&Helsel,1995) و همچنین به دلیل عدم برهم کنش با مواد زمینه، به شدت متحرک است (Boulgar et

براساس مطالعات وسیع انجام شده، آبهای زیرزمینی مناطق شهری در معرض خطرات آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند (برای مثال: شاه پسندزاده و دیگران، ۱۳۸۱؛ Hantzsche&Finnemore(1992); Starr&Gillham(1993)). یکی از مهم‌ترین عوامل غیر قابل شرب نمودن آبها، به ویژه در مناطق با

کشاورزی نیترا بسیار کوچک است. شایان ذکر است که قطع درختان جنگلی به همراه توسعه مراتع، سبب تشدید خطر آلودگی آبهای زیرزمینی این نواحی، به‌ویژه در مناطقی مرطوب مانند شهر گرگان می‌شود. در مراتع مانند مزارع، مقدار قابل توجهی نیترا در چرخه های زیستی خاک ایجاد می‌شود که نسبت به شستشو و انتقال به آبهای زیرزمینی به‌ویژه در بهار و پاییز حساس هستند. افزون بر این، فضولات حیواناتی که از مراتع و چراگاهها استفاده می‌کنند، باعث افزایش نیترا آبهای زیرزمینی این مناطق می‌شود.

براساس گزارش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۱۳۷۶)، بیشینه غلظت مجاز نیترا در آب شرب، ۵۰ میلی‌گرم در لیتر است. بالا بودن میزان نیترا در آبهای آشامیدنی، باعث بروز بیماری توأم با مرگ و میر در نوزادان و اطفال به نام متهموگلوبینمی (Methemoglobinemia) یا سیانوز نوزادان (Infant cyanosis)، سرطان در انسان، و بروز بیماریهای گوارشی می‌شود (Wylie et al., 1995; Bouchard et al., 1992). با توجه به استفاده روزافزون از کودهای شیمیایی برای افزایش محصولات کشاورزی و همچنین تمرکز جمعیت و توسعه فعالیت‌های صنعتی در منطقه گرگان، به‌ویژه در چند سال اخیر، این مقاله برای نخستین بار به بررسی علل احتمالی بالا بودن میزان نیترا آبهای زیرزمینی شهر گرگان پرداخته است.

#### زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه

شهر گرگان در طول جغرافیایی  $25^{\circ} 54'$  تا  $28^{\circ} 54'$  خاوری و عرض  $36^{\circ} 49'$  تا  $36^{\circ} 51'$  شمالی در دامنه شمالی البرز قرار دارد. این شهر روی مخروط افکنه‌های رودخانه‌های زیارت (ناهار خوران)، انجیر آب و گرمابدشت که از شاخه‌های فرعی رود قره سو به شمار می‌روند، قرار گرفته است. رودخانه‌های زیارت و النگ دره و سفره‌های آب زیرزمینی منطقه، منابع تأمین آب شرب شهر گرگان را تشکیل می‌دهند (شکل ۱). از نظر زمین‌شناسی، در منطقه مورد مطالعه واحدهای سنگی از پالئوزویک (مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان) تا کواترنری رخنمون دارند (شکل ۲؛ برای مثال، Berger, 1972؛ فنونی، ۱۳۶۸ و شاه پسندزاده، ۱۳۷۱). به علت نفوذپذیری کم و نبود سفره‌های آب گسترده در سنگهای دگرگونی گرگان در مقایسه با نهشته‌های مخروط افکنه‌ای کوهپایه‌ها، ژرفای بیشتر چاههای آب منطقه محدود به این سنگ کف می‌شود. براساس مقاطع شکست لرزه‌ای، ژرفای متوسط سنگهای دگرگونی گرگان در کوهپایه‌های جنوبی ناحیه مورد مطالعه، حدود ۵۰۰ متر است که در دشت گرگان به بیش از ۸۰۰ متر می‌رسد. بنابراین، چاههای آب شرب منطقه گرگان، اغلب در نهشته‌های مخروط افکنه‌ای کوهپایه‌ها شامل شن، ماسه و سیلت حفر شده‌اند. در کوهپایه‌های منطقه

(al., 1989). به طور کلی می‌توان چهار منشأ برای بالا بردن میزان نیترا در آبهای زیرزمینی مناطق شهری پیشنهاد کرد:

(۱) مواد چاههای فاضلاب خانگی و مواد زاید شهری پیشنهاد کرد: (Sommer & Gillham, 1984; Ritter & Chirnside, 1984; Marin & Perry, 1995; Pacheco et al., 2001). مواد زاید آلی شامل فاضلابها، مواد زاید جامد و ضایعات صنایع غذایی، اغلب به‌عنوان منشأ نیترا در چرخه نیتروژن مطرح هستند. این نیتروژنها برخلاف نیتروژن غیر آلی زمان زیادی در چرخه فوق پایدار خواهند ماند. با توجه به نقش مخرب فاضلابها بر محیط زیست، به‌ویژه کیفیت آبهای زیرزمینی، استفاده از آنها در آبیاری مزارع، جنگلها و فضاها سبز، تحت کنترل و مقررات شدیدی قرار دارد، به طوری که امکان آلودگی آبهای زیرزمینی توسط فاضلابها باید قاعداً محدود باشد. آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر چاههای فاضلاب خانگی در نواحی بسیاری از ایالات متحده آمریکا گزارش شده است (Keeney, 1986).

(۲) کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی - انسانی که برای بهبود کیفیت خاک در مناطق کشاورزی استفاده می‌شوند. فضولات حیوانی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع افزایش نیترا در آبهای زیرزمینی مطرح هستند. یکی از بهترین روشهای استحصال فضولات حیوانی، بازچرخش و افزودن آنها به خاکهای کشاورزی به‌عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی است (Pratt, 1984; Bernhand et al., 1992; Hamilton & Helsel, 1995). در هر حال، با توجه به عدم استفاده گسترده از این فناوری در کشور و همچنین هزینه زیاد و مشکلات حمل ضایعات حیوانی، فضولات فوق را مستقیماً به‌عنوان کود در مزارع استفاده می‌کنند.

(۳) انحلال نهشته‌های تبخیری یا خاکهای غنی از نیترا توسط آبهای زیرزمینی به‌ویژه در مناطق خشک. بالا بودن میزان نیترا در آبهای زیرزمینی زمینهای غیر کشاورزی و کم جمعیت می‌تواند ناشی از شسته شدن نیترا موجود در نهشته‌های تخریبی باشد (Heaton, 1984). برای مثال، مقدار قابل توجهی نیترا در لس‌آنجلس پلیستوسن نواحی نیمه خشک به‌ویژه در زمانهای مناسب برای رشد و نمو گیاهان گزارش شده است (White & Moore, 1972; Boyce et al., 1976).

(۴) تثبیت زیستی نیتروژن در خاکها توسط باکتریها و سپس انحلال آنها در آبهای زیرزمینی (Follett et al., 1987; Barnes et al., 1992; Wylie et al., 1995). نظر به این که جنگلها نقش بسیار مهمی در حفظ نیتروژن دارند، لذا قطع درختان و توسعه شهری می‌تواند باعث به هم خوردن چرخه نیتروژن شود که اغلب منجر به آزاد شدن مقدار قابل توجهی نیتروژن به‌صورت نیترا، به آبهای زیرزمینی می‌شود. البته، نقش این عامل در مقایسه با منشأ

### روش مطالعه

در ابتدا، به منظور بررسی علل احتمالی بالا بودن میزان نیترات منابع تأمین آب شرب شهر گرگان، از نهشته های سطحی گستره شهر گرگان بازدید به عمل آمد. سپس زمین شناسی زیر سطحی این منطقه با گردآوری اطلاعات موجود شامل: گمانه چاه های حفاری شده، مطالعات ژئو الکتریکی و غیره بررسی شد. میزان نیترات و کلر آب های زیرزمینی و رودخانه های زیارت و النگ دره در تابستان و پاییز ۱۳۸۰ اندازه گیری شد. نمونه های آب زیرزمینی با تخلیه آب از چاه ها پس از استخراج حجمی برابر با "۳ برابر حجم لوله داخل هر چاه، با این هدف که نمونه های آب نماینده سفره آب زیرزمینی باشد، صورت گرفته است. این نمونه ها در ظروف پلاستیکی شستشو شده با اسید سولفوریک به منظور جلوگیری از رشد باکتریها جمع آوری شده اند. پیش از تجزیه شیمیایی، نمونه های آب به آزمایشگاه انتقال داده شده و در محیط سرد (حدود ۴ درجه سانتیگراد) و تاریک یخچال نگهداری شده اند. برای اندازه گیری نیترات نمونه های آب، از روش کاهیدگی کادمیم توسط دستگاه طیف نور سنج و برای کلر از روش تیتراسیون با نیترات جیوه استفاده شده است (به ترتیب طبق دستورالعمل های آزمایشگاهی و APHA, 1998).

### نتایج تجزیه شیمیایی منابع آب شرب

نتایج تجزیه شیمیایی آب شرب شهر گرگان، تغییرات قابل توجهی را در غلظت نیترات (از ۳/۵۲ تا ۶۹/۵۲ میلی گرم در لیتر) نشان می دهد. مقدار نیترات در نمونه های آب کم ژرفا از ۸/۸ تا ۱۳/۲ میلی گرم در لیتر متغیر است (جدول ۱). پایین ترین غلظت سالانه نیترات در آبخوان های زیارت، گرمابدشت و شصت کلا، به ترتیب ۱۲/۵۴ میلی گرم در لیتر (چاه شماره ۴)، ۱۳/۲ میلی گرم در لیتر (چاه شماره ۳۰) و ۷/۲۵ میلی گرم در لیتر (چاه شماره ۳۹) است که به عنوان بالاترین مقدار نیترات زمینه این آبخوانها مطرح است. با توجه به جدول ۱، غلظت نیترات بیشتر چاه های آب شرب منطقه مورد مطالعه، بالاتر از حد زمینه نیترات است. افزون بر این، مقدار نیترات آب چاه های شماره ۵۵۸، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ بیش از مقدار مجاز آن در آب های آشامیدنی است (APHA, 1998).  
تمرکز آنیون کلر در آب های زیرزمینی منطقه گرگان از ۷/۹ تا ۲۰۴ میلی گرم در لیتر متغیر است. الگوی تغییرات غلظت کلر در چاه های با مقدار غیر مجاز نیترات، از الگوی تغییرات غلظت نیترات این چاهها تبعیت می کند. در ضمن، چاه های شماره ۱، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دارای غلظت بالای کلر اما غلظت کم نیترات است. براساس نقشه کاربری زمین های منطقه مورد مطالعه، کلیه چاه های با تمرکز زیاد نیترات و کلر در محدوده شهری قرار دارند.

مورد مطالعه، می توان نهشته های پراکنده لس را مشاهده کرد که از جنوب به شمال افزایش ستبرای نشان می دهند. برای مثال، براساس اطلاعات چاه های حفاری شده، ستبرای این لسه ها در نزدیکی چاه شماره ۴ تقریباً صفر است ولی ستبرای آنها در بخش های شمالی شهر گرگان، به بیش از ۷۰ تا ۱۳۰ متر می رسد.

برخی از منابع تأمین آب شرب شهر گرگان، به ویژه در بخش های جنوبی منطقه، در نهشته های ریز دانه دشت گرگان حفر شده اند. سطح دشت گرگان را لایه نازکی از سیلت و رس به ستبرای صفر تا ۵۰ متر تشکیل می دهد، این دشت روی لایه ای از مارن های میوسن - پلیوسن متناوب با شن و ماسه قرار گرفته است. این لایه های شن و ماسه سفره های آب زیرزمینی بخش جنوبی منطقه گرگان را تشکیل می دهند. در بعضی نقاط، نهشته های دریایی میوسن - پلیوسن با مرزهای تدریجی در زیر رسوبات مخروط افکنه ای کوهپایه های گرگان قرار دارند (شکل ۳).

براساس حفاری های انجام شده و مطالعات زمین فیزیکی، می توان دو نوع سفره آب زیرزمینی در منطقه گرگان شناسایی کرد (شکل ۳؛ Berger, 1972؛ فوننی، ۱۳۶۸):

۱) سفره های آب کم ژرفا با ستبرای ۵ تا ۵۰ متر: سطح آب زیرزمینی در این سفره ها تحت تأثیر میزان بارندگی و تبخیر، آب برگشتی زراعی و مصرفی کشاورزان و شهروندان به ترتیب زمین های کشاورزی و چاه های فاضلاب به سفره های آب کم ژرفا، میزان برداشت آب از چاه های زراعی و شرب کم ژرفا و هم چنین مقدار نفوذ آب رودخانه های این منطقه است. سفره های آب کم ژرفا را می توان بیشتر در نهشته های دانه درشت مخروط افکنه ای واقع در کوهپایه های شمالی شهر گرگان دید. سفره های آب کم ژرفا بخش های شمالی شهر گرگان، به طور عمده از راه رودخانه های زیارت، النگ دره، گرمابدشت و همچنین جریانه های زیرسطحی سازندهای سخت منطقه، تغذیه می شوند. آب این سفره های کم ژرفا به سفره های آب محصور و نیمه محصور بخش های جنوبی شهر، تخلیه می شود.

۲) در زیر سفره های آب کم ژرفای دشت گرگان، لایه های نازک تا ستبرای مارنی یا رسی - سیلتی شناخته شده است. این لایه های دانه ریز، سبب تشکیل سفره های محصور تا نیمه محصور عمقی در نهشته های سخت نشده و کمی سخت شده شن و ماسه ای متناوب با آنها شده اند. بنابراین، می توان در دشت جنوب گرگان دو نوع سفره آب کم ژرفا و ژرف را معرفی کرد، به گونه ای که در نزدیکی کوهپایه های منطقه مورد مطالعه، یک پهنه تدریجی یا حد واسط از سفره های مذکور وجود دارد (شکل ۳).

### توزیع مکانی نیترات در آبهای زیرزمینی

فاضلاب خانگی با گذشت زمان، امکان آلودگی آب این چاهها بسیار زیاد است. افزون بر این، در آبخوان زیارت، میزان نیترات آب چاههای شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ که در محدوده زمینهای جنگلی و بیشه زار مترکم قرار می‌گیرند، در مقایسه با چاههای واقع در مراتع و جنگلهای تخریب شده بسیار کم است. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قطع درختان جنگلی و توسعه شهر گرگان نیز سبب به هم خوردن چرخه نیتروژن و آزاد شدن مقدار قابل توجهی نیترات به آبهای زیرزمینی منطقه شده باشد.

یکی از راههای تعیین منشأ نیترات آبهای زیرزمینی، تعیین نسبتهای  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  و  $\text{K/Cl}$  است. منشأ کلر و پتاسیم در منطقه مورد مطالعه، می‌تواند نفوذ آب دریا یا فعالیتهای انسان زاد (کودهای شیمیایی، فاضلابهای خانگی) باشد. سفره‌های آب زیرزمینی که تحت تأثیر آلودگی ناشی از فاضلابهای خانگی یا مواد زاید شهری قرار می‌گیرند، معمولاً با غلظت بیشتر کلر نسبت به بخشهای قابل شرب سفره، مشخص می‌شوند. جالب توجه است که بیشتر نمونه‌های آب چاههای با غلظت غیرمجاز نیترات (۵ میلی‌گرم در لیتر) با مقادیر بالای  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  نسبت به دیگر نمونه‌های آب منطقه مورد مطالعه مشخص می‌شوند. بالا بودن نسبت  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  آب این چاهها که در محدوده زمینهای شهری قرار می‌گیرند، منشأ فاضلابهای خانگی را به‌عنوان عمده‌ترین عامل آلودگی نیترات آبخوان زیارت تأیید می‌کند.

نسبت  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  نمونه‌های آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از ۰/۰۸ (چاه شماره ۳۳) تا ۱/۲۲ (چاه شماره ۳۶) متغیر است؛ در صورتی که نسبت  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  آبهای سطحی این منطقه بین ۰/۱۳ تا ۰/۸۸ تغییر می‌کند (جدول ۱). پایین بودن مقدار  $\text{NO}_3/\text{Cl}$  در آب رودخانه‌های النگ دره و زیارت نسبت به آب چاههای شرب آبخوان زیارت، عدم ورود نیترات از زمینهای کشاورزی (منشأ کودهای شیمیایی) به منابع آب شرب گرگان را تأیید می‌کند.

### مقایسه با سایر مطالعات آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی

در جدول ۲ خلاصه‌ای از انواع منابع آلودگی آبهای زیرزمینی توسط نیترات و همچنین نوع آبخوانها ذکر شده است. با توجه به جدول فوق، منشأ بالا بودن نیترات بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی، کودهای شیمیایی هستند. در صورتی که مطالعات انجام شده در منطقه گرگان، آلودگی نیترات بعضی از منابع تأمین آب شهر گرگان را فاضلابهای خانگی نشان می‌دهد. مطالعات (Hantzsche & Finnemore, 1992) در آبخوانهای شن و ماسه (آبرفتی) نیز بر بالا بودن غلظت نیترات آب این سفره‌های زیرزمینی در اثر فاضلابهای خانگی اشاره می‌کند. منشأ نیترات اغلب آبخونهای شن و

شکل ۴ نقشه خطوط هم‌تراز نیترات منابع تأمین آب شرب شهر گرگان را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، منحنیهای هم‌تراز نیترات، در دو منطقه که در محدوده زمینهای شهری قرار دارند، متمرکز است. اگرچه تغییرات سنگ شناسی قابل ملاحظه‌ای در راستای خاوری - باختری (به موازات رشته کوههای البرز) در منطقه مورد مطالعه مشاهده نمی‌شود، اما تمرکز منحنیهای هم‌تراز نیترات در آبخوانهای گرمابدشت و شصت کلا بسیار کم است. با توجه به این که چاههای تأمین آب شربی که در آبخوانهای گرمابدشت و شصت کلا حفر شده‌اند، در منطقه کشاورزی قرار دارند، بنابراین، منشأ آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه گرگان را منابعی غیر از کودهای شیمیایی تشکیل می‌دهند. در نتیجه، می‌توان منشأ عمده نیترات آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه را فاضلابهای خانگی پیشنهاد نمود.

### بحث

#### منشأهای احتمالی نیترات در آبهای زیرزمینی

در گستره شهر گرگان، می‌توان دو منشأ عمده را برای نیترات موجود در منابع آب شرب این شهر پیشنهاد کرد: فاضلابهای خانگی و تثبیت زیستی نیتروژن در خاک به همراه شستشو و انتقال آن به آبهای زیرزمینی. با توجه به این که در گمانه چاههای آب این منطقه و همچنین در مطالعات ژئوالکتریک، اثری از واحدهای سنگی تبخیری گزارش نشده است (Berger, 1972 و فنونی، ۱۳۶۸)، لذا، امکان وجود نهشته‌های تبخیری با شک و تردید همراه است. پایین بودن غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی آبخوانهای شصت کلا و گرمابدشت (چاههای شماره ۲۸، ۳۳، ۳۴ و ۳۹) به‌رغم قرارگیری چاههای شرب این آبخوانها در محدوده زمینهای کشاورزی نسبت به آبهای زیرزمینی آبخوان زیارت، نشانگر عدم تأثیر یا اثر ناچیز کودهای شیمیایی بر آلودگی آبهای شرب این منطقه است. با توجه به دفع سنتی فاضلاب و تراوایی به نسبت خوب زمینهای دریافت‌کننده فاضلاب در این منطقه، مهم‌ترین منشأ نیترات در نمونه‌های آب چاههای شرب شهر گرگان، فاضلابهای خانگی پیشنهاد می‌شود. بیشتر چاههایی که بیشترین مقدار نیترات منطقه را دارا هستند، در بخشهای شمالی شهر (چاههای شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۳) قرار دارند. با توجه به این که شیب توپوگرافی و جهت جریان آبهای زیرزمینی این منطقه از جنوب به سوی شمال است؛ بنابراین، انتقال آلودگی آب این چاهها توسط فاضلابهای خانگی تأیید می‌شود. بالا بودن مقدار نیترات را در دو چاه شماره ۵ و ۸ که در بخش جنوبی شهر گرگان قرار دارند (شکل ۱)، می‌توان ناشی از قدمت حفر و بهره‌برداری از آب این چاهها در نظر گرفت. این چاهها، قدیمی‌ترین چاههای بهره‌برداری شده برای تأمین آب شرب شهر گرگان هستند که با توجه به توسعه سطح جذب چاههای

نواحی، ضمن کاهش قابلیت تصفیه زمین در اثر نفوذ دائمی فاضلاب، امکان تداخل سطح جذب چاههای فاضلاب نیز وجود دارد. به علاوه، بالا بودن نسبت  $NO_3/Cl$  آب چاههای آلوده، نتیجه گیری فوق را تأیید می کند. البته، قطع درختان جنگلی و توسعه روزافزون شهر گرگان به ویژه در چند سال گذشته، نیز می تواند بر تشدید خطر آلودگی نترات آبهای زیرزمینی این نواحی بیفزاید. جنگلها نقش بسیار مهمی در حفظ نیتروژن خاک دارند که با قطع کردن آنها، امکان شستشو و انتقال مقادیر قابل توجهی نیتروژن به صورت نترات به سفره های آب زیرزمینی وجود دارد. با توجه به اثرات سمی نترات به ویژه در کودکان و استفاده بهینه از چاههای آب شرب آلوده به نترات، رقیق سازی و اختلاط آبهای آلوده با آبهای کم نترات به همراه تبادل یونی با استفاده از رزینها به منظور جایگزینی نترات با عوامل غیر زیان آور پیشنهاد می شود. در ضمن، اعمال برنامه های مدیریتی مانند پهنه بندی غلظت نترات در آبهای زیرزمینی برای تعیین محل حفر چاههای آب شرب و انتخاب منابع تأمین آب شرب دور از مناطق شهری و صنعتی را می توان در کاهش خطر آلودگی نترات آب شرب شهر گرگان مطرح کرد.

### تشکر و قدردانی


جهت انجام این پژوهش از حمایت های مدیر امور آب و فاضلاب شهر گرگان قدردانی می نمایم. به علاوه، از نقطه نظرات ارزشمند آقای دکتر غلامعباس کاظمی و هم چنین داوران محترم این مقاله، به ویژه آقای دکتر خان ناظر که در بهبود کیفیت این مقاله نقش موثری داشته است، کمال تشکر را داریم.

ماسه ای را در مقایسه با دیگر آبخوانها، فاضلابهای خانگی و مواد زاید شهری تشکیل می دهد.

### نتیجه گیری



تجزیه شیمیایی آبهای زیرزمینی و سطحی گستره گرگان، بالا بودن مقدار نترات در برخی چاههای تأمین آب شرب این شهر را نشان می دهد. دو منطقه با غلظت غیرمجاز نترات در آبهای زیرزمینی، در محدوده زمینهای شهری گزارش می شود (شکل ۴). با توجه به موارد زیر، امکان آلودگی سفره های آب زیرزمینی این منطقه در اثر فاضلابهای خانگی ناممکن نیست.

۱) تخلیه فاضلابهای خانگی شهر گرگان در چاههای جذبی، ۲) تراوایی خوب شن و ماسه، ۳) بالا بودن میزان نترات در چاههای قدیمی تأمین کننده آب شرب شهر، ۴) شیب توپوگرافی و جهت جریان آب زیرزمینی از جنوب به شمال، ۵) بالا بودن سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه، ۶) بالا بودن غلظت نترات در بخشهای شمالی آبخوان زیارت که شهر گرگان بر روی آن قرار گرفته، ۷) عدم آلودگی نترات در سفره های آب زیرزمینی آبخوانهای گرمادشت و شصت کلا، به رغم کاربری کشاورزی این زمینها، ۸) عدم گزارش واحدهای سنگی تبخیری در مطالعات ژئوالکتربیک و چاههای آب شرب منطقه، ۹) پایین بودن غلظت  $NO_3/Cl$  در آب رودخانه های النگک دره و زیارت نسبت به آب چاههای شرب آبخوان زیارت و ۱۰) بالا بودن مقدار کلر در چاههای آب آلوده به نترات. اغلب چاههای آب شرب آبخوان زیارت در بخشهای قدیمی شهر که از تراکم جمعیت زیادی برخوردارند، واقع است. در این




شکل ۱- نقشه منابع تأمین آب شرب شهر گرگان.





شکل ۳- برش زمین شناسی نهشته های آبرفتی آبخوان زیارت. این برش با راستایی شمالی- جنوبی از شهر گرگان تا رودخانه قره سو بر پایه اطلاعات ۵ حلقه چاه آب اکتشافی و بهره برداری رسم شده است (با تغییرات از Berger, 1972).

شکل ۲- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (با تغییرات از شهبابی، ۱۳۶۹؛ زمانی پدram و حسینی، ۱۳۸۲).



شکل ۴- نقشه توزیع مکانی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه.

جدول ۱- کیفیت شیمیایی منابع تامین آب شرب شهرستان گرگان.

نام آبخوان	شماره چاه	عمق چاه	پاییز ۱۳۸۰					تابستان ۱۳۸۰							
			pH	K / Cl	NO3/Cl	K (ppm)	Cl (ppm)	NO3 (ppm)	pH	K / Cl	NO3/Cl	K (ppm)	Cl (ppm)	NO3 (ppm)	
آبخوان زیارت	۱	۲۵/۹۶	۷/۱۰	۱۱۰	۲۵/۹۶	۷/۱۰	۱۱۰	۲۵/۹۶	۷/۱۰	۱۱۰	۲۵/۹۶	۷/۱۰	۱۱۰	۲۵/۹۶	
	۲	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	
	۳	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	
	۴	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶	۱۰	۱۳/۶
	۵	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶	۹۰	۱۳/۶
	۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶
	۷	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶	۱۵۳	۱۳/۶
	۸	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶	۱۲۰	۱۳/۶
	۹	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶	۱۳۰	۱۳/۶
	۱۰	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶	۱۸۸	۱۳/۶
	۱۱	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶
	۱۲	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶	۳۵۰	۱۳/۶
	۱۳	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶
	۱۴	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶	۲۰۶	۱۳/۶
۱۵															
۱۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	۲۱۲	۱۳/۶	
۱۷	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	۱۵۰	۱۳/۶	
۱۸	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	
۱۹	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	۳۱۹	۱۳/۶	
۲۰	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	۲۲۴	۱۳/۶	
۲۱	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	
۲۲	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	
۲۳	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	۲۰۴	۱۳/۶	
۲۴	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	۱۸۵	۱۳/۶	
۲۵															
۲۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	۱۶۰	۱۳/۶	
۲۷	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	۱۱۵	۱۳/۶	
۲۸	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	۱۱۳	۱۳/۶	
۲۹	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	
۳۰	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	
۳۱	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	۱۲۳	۱۳/۶	
۳۲	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	۱۳۶	۱۳/۶	
۳۳															
۳۴	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	۱۹۰	۱۳/۶	
۳۵	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	
۳۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	۱۹۸	۱۳/۶	
۳۷	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	۲۰۰	۱۳/۶	
۳۸	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	۱۹۵	۱۳/۶	
۳۹	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	۲۰۱	۱۳/۶	
زیارت دره															
آهک															

جدول ۲- مقایسه آلودگی نیترات انواع مختلف سفره های آب زیرزمینی.

نوع سفره آب زیرزمینی	میزان نیترات (ppm)	منشا نیترات	کشور	مرجع
ماسه دانه ریز	۱۵-۰	کودهای شیمیایی	کانادا	ستار و گیلهام (۱۹۹۳)
ماسه دانه درشت	۳۴-۱۲	کودهای شیمیایی	هند	دشینده و همکاران (۱۹۹۳)
بازالت ها	۶-۴۵	کودهای شیمیایی	هند	دشینده و همکاران (۱۹۹۳)
ماسه های پادگانه ای	۶۴/۹	فاضلاب	امریکا	هانتز و فینه مور (۱۹۹۳)
ماسه و قنوه سنگ	۴۰-۱۳	فاضلاب	امریکا	هانتز و فینه مور (۱۹۹۳)
ماسه های بادی	۴۰-۱۳	فاضلاب	امریکا	هانتز و فینه مور (۱۹۹۳)
سنگ آهک	۵/۹-۱	کودهای شیمیایی	امریکا	بک و همکاران (۱۹۸۵)
رسوبات آبرفتی	۶-۱۰	مراتع	نیوزیلند	بور دن (۱۹۸۶)
سنگ آهک	۱۰	مراتع	استرالیا	یرس (۱۹۸۲)
بازالت ها	۳۶-۹	مراتع	پاوار و شیخ (۱۹۹۵)	

## کتابنگاری

- زمانی پدرام، م. و حسینی، ح.، ۱۳۸۲- نقشه و گزارش زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ گرگان، شماره ۶۸۶۳، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، یک ورقه.
- شاه پسندزاده، م.، ۱۳۷۱- تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان، دانشگاه تربیت معلم تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی، ۲۹۷ صفحه.
- شاه پسندزاده، م.، رقیمی، م.، دماوندی، م. ز. و خادمی، م.، ۱۳۸۱- بررسی منشأ احتمالی آلودگی نیترات منابع تامین آب شرب شهر گرگان. مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (۵-۷ شهریور)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صص ۵۱-۴۵.
- شهرابی، م.، ۱۳۶۹- نقشه زمین شناسی گرگان (مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰۰)، شماره H4، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، یک ورقه.
- فنون، ب.، ۱۳۶۸- بررسی علل افت سطح آب چاه های شرب شهر گرگان. اداره کل آبیاری گرگان، گزارش داخلی، ۸۲ صفحه.
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۶- ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی. شماره استاندارد ۱۰۵۳، تهران، ۱۳ صفحه.

## References

- APHA. , 1998- Standard methods for examination of water & waste water. American Public Health Association, Washington, DC.
- Barnes, C. J., Jacobson, G. & Smith, G. D. , 1992- The origin of high - nitrate ground waters in the Australian arid zone. Journal of Hydrology, 137: 181-197.
- Beck, B.F., Asmussen, L. & Leonard, R., 1985- Relationship of geology, physiography, agricultural land, and ground- water quality in southwest Georgia. Ground Water, 23:627-634.
- Berger, L., 1972- Complimentary investigation of ground - water development in the Gorgan and plain area, Gorgan Project, vol.1: Geology and geophysics, hydrology and water resources, Payab Consulting Engineers, 304p.
- Bernhand, C., Carbiener, R., Cloots, A.R. , Froehlicher, R., Schenck, CH. & Zilliox, L., 1992- Nitrate pollution of ground water in the Alsatian plain (France) - A multidisciplinary study of an agricultural area: The central Reid of the 111 river. Environmental Geology Water Science, 20: 125-137.
- Bouchard, D.C., Williams, M.K. & Surampalli, R.Y. , 1992- Nitrate contamination of groundwater: sources and potential health effects. Journal of American Water Works Association, 84:85-90.
- Boyce, J. S., Muir, J., Edwards, A. P. , Seim, E. C. & Olson, R. A. , 1976- Geologic nitrogen on Pleistocene loess of Nebraska. Journal of Environmental Quaternary, 5: 93-96.
- Boulgar, P.R., Kehew, A.E & Nelson, R.A. , 1989- Dissimilatory nitrate reduction in a waste-water contaminated aquifer. Groundwater, 5:664-671.
- Burden R.J., 1986- Elevated levels of nitrate in ground water beneath intensively grazed pastureland in New Zealand. In: Vrba, J. and E. Romijn (Eds.), Impact of agricultural activities on ground water, vol. 5. Hanover: Verlag Heinz Heise: 263-270.
- Deshpandeh S. M., Kaplay, R.D. & Deshmukh, A.N. , 1993- Nitrate contamination of ground water in Paithan Taluka of Aurgangabad district. Abstract volume, Seminar on Geology of Maharashtra: Economical and Environmental Aspects. Solapur; Shivaji University, P.G. Center. 14p.
- Follett, R. F., Gupta, S. C. & Hunt, P. G. , 1987- Relation to the management of plant nutrients for crop production soil science. Society of American Special Publication, 19, 51p.
- Hamilton, P.A., & Helsel, D.R. , 1995- Effects of agriculture on ground-water quality in five regions of United States. Groundwater, 33:217-226.
- Hantzche, N.N & Finnemore, M., 1992- Predicating ground water nitrate impacts. Ground Water, 30: 490-500.
- Heaton, T.H.E., 1984- Sources of the nitrate in phreatic groundwater in the Western Kalahari. Journal of Hydrology, 67: 249-259.
- Keeney, D.R., 1986- Source of nitrate to groundwater, CRC critical reviews in environmental control, 6: 257-304.
- Kreitler, W.W. & Browning, L.A. , 1983- Nitrogen- isotope analysis of groundwater nitrate in carbonate aquifers: natural sources versus human pollution. Journal of Hydrology, 61:285-301.
- Marin, L.E. & Perry, E.C. , 1995- The hydrology and contamination potential of northwestern Yucatan, Mexico. Geofis International 33:619-623.
- Pacheco A.J. & Cabrera, S.A. , 1997- Groundwater contamination by nitrates in the Yucatan peninsula, Mexico. Hydrogeological Journal, 5:47-53.
- Pacheco, J., Marin, L., Cabrera, A., Steinich, B. & Escolero, O., 2001- Nitrate temporal and spatial pattern in 12 water - supply wells, Yucatan, Mexico. Environmental Geology, 40: 708-715.
- Pawar, N. J. & Shaikh, I.J. , 1995- Nitrate pollution of groundwater from shallow basaltic aquifers, Deccan trap, Indian Environmental Geology, 25:197-204.

- Pearce, B.R., 1982- Fractured rock aquifer in central Queensland. Proceedings, international conference on groundwater in fractured rock aquifers, Canberra: Australian Government Publishing Service. 161-172.
- Pratt, P.J., 1984- Nitrogen uses and nitrates leaching in irrigated agriculture. American Society Agronomic Madison, WI: 319-333.
- Ritter, W.F. , & Chirnside, A.E.M. , 1984- Impact of land use on ground-water quality in southern Delaware. Groundwater, 22:38-47.
- Sommer, L.S. & Gillham, P.M. , 1984- Use of nitrogen from agricultural industrial and municipal wasted. American Solid Science, 2: 207-220.
- Starr, R.C. & Gillham, R.W. , 1993- Gentrification and organic carbon availability in tow aquifers. Groundwater, 31:934-948.
- White, E.M. & Moore, D.G. , 1972- Nitrate in South Dakota range Soils. Journal Range Magazine, 25:27-32.
- Wylie, B.K., Shaffer, M.J. & Hall, M.D. , 1995- Regional assessment of NLEAP No<sub>3</sub>-N leaching indices. Water Resources Bulletin, 31:99-408.

\* گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
\*\* شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

\*Geology Department, College of Sciences, University of Agricultural and Natural Resources of Gorgan.

\*\*The Water and Sewage Company of Golestan Province, Gorgan, Iran